




АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ЧТО ТАКОЕ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)?

Инфекционное заболевание, вирус очень устойчив и может долго сохраняться во внешней среде, а также в продуктах и воде. Даже при замораживании или высушивании продуктов вирус сохраняет свои свойства.

Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб. Погибает до 100% заболевших животных. Профилактической вакцинации не существует.



КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода и т. п.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» единственной мерой борьбы является полное уничтожение поголовья свиней в очагах инфекции.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ

От заражения до появления симптомов заболевания проходит 2-7 дней.

У животных повышается температура тела до 42 градусов. Появляется одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралич задних конечностей, на коже появляются красно-фиолетовые пятна.

Смерть наступает на 1-5 день.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ВАЖНО!

К появлению африканской чумы свиней (АЧС) приводит скормливание свиным непроваренными пищевыми отходами домашней кухни, пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

КАРАНТИН

Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех свиней, находящихся в эпизоотическом очаге, умерщвляют бескровным методом, туши сжигают. Навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и пр. сжигают.

Также уничтожаются грызуны и обеспечивается отсутствие безнадзорных животных.

Карантин отменяется после уничтожения свиней в хозяйстве и в радиусе 20 км, а также после проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий. После карантина в хозяйстве разрешается заводить свиней только через год.

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

продажа на рынках продуктов животноводства и вывоз их за пределы очага; вывоз свиней, продукции свиноводства, продуктов растениеводства (и после карантина в последующие 6 месяцев)

Информация о государственных ветеринарных клиниках
Московской области



В экстренных случаях обращайтесь
в государственные учреждения ветеринарии МО
или в единый контактный центр
государственной ветеринарной службы
Минсельхозпрода МО

+7 (495) 668-01-25
msh.mosreg.ru



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ВАЖНО!

К появлению африканской чумы свиней (АЧС) приводит скармливание свиньям непропаренных пищевых отходов домашней кухни, пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

КАРАНТИН

Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех свиней, находящихся в эпизоотическом очаге, умерщвляют бескровным методом, туши сжигают. Навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и пр. сжигают.

Также уничтожаются грызуны и обеспечивается отсутствие безнадзорных животных. Карантин отменяется после уничтожения свиней в хозяйстве и в радиусе 20 км, а также после проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий. После карантина в хозяйстве разрешается заводить свиней только через год.

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

продажа на рынках продуктов животноводства и вывоз их за пределы очага; вывоз свиней, продукции свиноводства, продуктов растениеводства (и после карантина в последующие 6 месяцев)

В экстренных случаях обращайтесь в государственные учреждения ветеринарии МО или в единый контактный центр государственной ветеринарной службы Минсельхоза МО

+7 (495) 668-01-25
msh.mosreg.ru

Информация о государственных ветеринарных клиниках Московской области



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ



ЧТО ТАКОЕ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)?

Инфекционное заболевание, вирус очень устойчив и может долго сохраняться во внешней среде, а также в продуктах и воде. Даже при замораживании или высушивании продуктов вирус сохраняет свои свойства.

Болезнь распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб.

Погибает до 100% заболевших животных.

Профилактической вакцинации не существует.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода и т. п.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» единственной мерой борьбы является полное уничтожение поголовья свиней в очагах инфекции.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ

От заболевания до появления симптомов заболевания проходит 2-7 дней.

У животных повышается температура тела до 42 градусов. Появляется одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралич задних конечностей, на коже появляются красно-фиолетовые пятна.

Смерть наступает на 1-5 день.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!